Vizsgálatok: Baktériumok aerob és anaerob tenyésztése, gombák tenyésztése.

Mintavételi eszköz: Műanyag nyelű vattapálca transzport közeggel (steril mintavevő pálca transzport közeggel).

Minta: Orr-, torokváladék, szájnyálkahártya, szemváladék, fülváladék, melléküreg-váladék, műtéti és felszíni sebváladék, genitális váladék. Hüvelyváladék esetén a transzport közeg mellé 2 kenet beküldése is szükséges tárgylemezen.

Mintavétel módja: A váladékot vattatamponnal kell venni, majd a tampont belesüllyeszteni a transzport közegbe. A tampont a közegben kell hagyni.

A minta tárolása: **Szobahőn 24-48 óráig** tárolható. Hűteni nem szabad.

Vizsgálatok: Vizelet hagyományos bakteriológiai tenyésztése

Mintavételi eszköz: Bórsavas gyűjtőedény (30 ml)

Minta: Középsugár vizelet. Legalább félig szükséges tölteni az edényt. Más mintatípus vételéhez tilos használni ezt a mintavételi eszközt!

Mintavétel módja: A húgycsőnyílás lemosását követően lehetőleg a reggeli első vizelet középső porcióját (optimálisan az edény felső jeléig megtöltve) kell gyűjteni a mintavételi edénybe. Mintavétel előtt nem szabad a gyűjtőedény tartalmát (bórsav) kiönteni.

A minta tárolása: A kupakot figyelmesen kell visszacsavarni! A levett mintát mihamarabb a vizsgálatot végző laboratóriumba kell juttatni. A mintát **2-8°C-on** maximum **24 óráig** lehet tárolni. Lefagyasztani nem szabad!

Vizsgálatok: Baktérium aerob tenyésztése, gomba tenyésztése.

Mintavételi eszköz: Csavaros kupakú, széles szájú steril műanyag edény

Minta: Köpet, elsősugár vizelet (*Mycoplasma hominis*, *Ureaplasma urealyticum* tenyésztéshez) és ejaculatum

Mintavétel módja: Köpetvétel: száj vizes kiöblítését követően reggeli első köpet ürítése a tartályba, a kupak ellenőrzött rácsavarása.

Vizeletvétel: A húgycsőnyílás lemosását követően a vizelet első sugarának gyűjtése a mintavételi edénybe, majd a kupak figyelmes rácsavarása.

A minta tárolása: **2-8°C-on**, hűtőszekrényben tárolható maximum **24 óráig**.

Vizsgálatok: Baktérium tenyésztés, parazita, toxin, vírusantigén kimutatása székletből.

Mintavételi eszköz: Széklettartály kanállal, 2 tokban.

Minta: Frissen ürített széklet

Mintavétel módja: Külön tájékoztató alapján! A széklet nyákos, gennyes, véres részéből, a környezettel nem érintkezett részből a kanállal lehetőleg félig, kétharmadig tölteni a tartályba.
Féregrészeket izoláltan kell belehelyezni. Gondosan le kell zárni, a külső tartályokba visszahelyezni.
A mintát minél hamarabb a laboratóriumba kell juttatni.

A minta tárolása: **2-8°C-on**, hűtőszekrényben maximum **24 óráig** tárolható.

Vizsgálatok: Baktérium aerob és anaerob tenyésztése, gomba tenyésztése vérből.

Mintavételi eszköz: Hemokultúrás palack saját mintavételi szerelékkel.
Csak fekvőbetegintézmények számára!

Minta: Natív vér. Alkalmas a hemokultúra rendszer pleuralis-, pericardialis-, peritonealis-, izületi punktátum, liquor tenyésztésére is, amennyiben monobakteriális infekcióra van gyanú.

Mintavétel módja: Hagyományos módon kell mintát venni. (Lásd külön mintavételi tájékoztatót.) Felnőtt minta mennyisége: Egyszerre 2 palackba 10-10 ml (aerob+anaerob). Felnőtt palackba tölthető max. mennyiség 10 ml. Gyermek minta mennyisége: Testsúlytól függően a gyermek palackba 0,5-5 ml. Gyermek palackba tölthető max. mennyiség 5 ml.

A minta tárolása: **Szobahőn 24-48 óráig** tárolható. Hűteni nem szabad.

Vizsgálatok: *Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum* tenyésztés

Mintavételi eszköz: Mycoplasma IST2 R1 oldat (BioMérieux)
A mintavételi eszköz mintavétel előtt 2-8°C-on tárolandó!

Mintavétel módja: Vattapálcával/platinakaccsal rotáló mozdulattal vegyen mintát a cervixből/húgycsőből. A mintavevővel vett váladékot forgassa meg a speciális R1 transzport közegben, majd a mintavevő kivétele után zárja vissza a közeget tartalmazó üveg kupakját.

A minta tárolása: A minta a gyári transzportfolyadékban csak **2-8°C-on** tárolható maximum **48 óráig**.



Vizsgálatok: Perianális törlés vizsgálata *Enterobius vermicularis* irányban.

Mintavételi eszköz: 6-7 cm celluxcsík tárgylemezzel, vagy perianális törlőpálca.

Mintavétel módja: A mintavételezést negatív eredmény esetén érdemes megismételni.

1. Celluxcsík: A szalagot ragasztós felével a széthúzott farpofák között a perianális redőkhöz kell feszíteni. A szalagot gyűrődésmentesen a tárgylemezre kell ragasztani.
A mintát javasolt reggel, felkelés után, mosakodás és székelés előtt levenni.

1. Törlőpálca: A megnedvesített celofánsapkás törlőpálcával reggel felkeléskor – mosakodás és székelés előtt – a széthúzott farpofák mentén a végbélnyílás környékét kell megtörölni, de a celofán-sapkát nem szabad levenni a pálcáról.
A labor a celofánsapkát vizsgálja.

A minta tárolása: A mintát mihamarabb a laboratóriumba kell juttatni.
Tárolás szobahőmérsékleten.

Vizsgálatok: Szerológiai vizsgálatok, ellenanyag vagy antigén kimutatása vérből.

Mintavételi eszköz: Natív steril vérvételi cső.

Minta: 6-8 ml natív vér zárt rendszerben levéve, vagy lecentrifugált savó (3-5 ml).

A minta tárolása: A levett natív vérminta **2-8°C-on** hűtőszekrényben **1-2 napig**, a **savó -20°C-on** fagyasztva tovább tárolható.